

Early Warning Product : HEALTH WATCH BULLETIN: MALARIA

Valide du 21 Juillet au 17 Août 2026

Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale

****

Salle de Veille Multirisque

Pascal MOUDI IGRI, PhD

CAPC-AC

Early Warning Systems (EWS) and

Disaster Operations Expert

Email : moudipascal@yahoo.fr ;

igrimoudi@capc-ac.net

Tel : +237 655868308

Douala, Cameroun

CREWS CLIMATE RISK & EARLY WARNING SYSTEMS

UNDRR UN Office for Disaster Risk Reduction

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION



Préambule

Ce bulletin propose une **analyse prospective** des conditions climatiques et environnementales favorisant la recrudescence du paludisme, fondée sur des modèles régionaux et des indicateurs en temps réel.

Objectif principal : fournir une **alerte précoce** et des informations opérationnelles pour orienter la prise de décision proactive des acteurs de santé publique et de gestion des risques.

Finalité : anticiper les périodes et zones à risque afin de renforcer la préparation, la prévention et la réponse rapide, tout en optimisant l'allocation des ressources et en soutenant la résilience communautaire.

Ce cadre s'inscrit dans une logique de **santé anticipatoire**, alignée sur les objectifs internationaux de lutte contre les épidémies et de sécurité sanitaire.

Salle de Veille Multirisque

Facteurs de Risque


Les conditions climatiques et sanitaires observées au cours de la période analysée révèlent plusieurs facteurs de risque susceptibles d'intensifier la transmission du paludisme dans les zones vulnérables. Ces facteurs incluent notamment



Des précipitations abondantes et prolongées, favorisant la formation de gîtes larvaires dans les zones d'eau stagnante.



Une humidité atmosphérique élevée, propice à la survie et à l'activité des moustiques vecteurs.



Des températures compatibles avec le cycle de développement du parasite (Plasmodium), accélérant la maturation du vecteur.



Une occupation du sol favorable à la prolifération vectorielle, notamment : Les zones marécageuses et les plaines inondables, les agglomérations proches des cours d'eau ou des retenues d'eau, les milieux herbacés et les zones périurbaines mal assainies

Niveau de Vigilance/Actions




Surveillance quotidienne et prospection larvaire hebdomadaire ; distribution supplémentaire de moustiquaires ; pulvérisation intra-domiciliaire ciblée ; drainage des eaux stagnantes ; vérification des stocks ; cellule de coordination hebdomadaire.

Cameroun

Tchad






Reporting hebdomadaire renforcé ; veille entomologique allégée ; assainissement communautaire (curage, gestion des marécages) ; sensibilisation ciblée ; contrôle larvaire.

Cameroun

République Centrafricaine

Tchad


République Démocratique du Congo



Veille hebdomadaire ; intégration des alertes météorologiques ; contrôle larvaire ; mobilisation communautaire ; renfort des stocks.

République Démocratique du Congo

Prévison du 21 Juillet au 03 Août 2026



Diffusé le 22 juillet 2026
Valide: 2 semaines (21 juillet - 03 Aout 2026)

Surveillance Passive	Veille Sanitaire
Surveillance Renforcée	Surveillance Active

Recommandations 8

Rouge


* Urgence : Activez les plans d'urgence et mobilisez les équipes sanitaires.
*Lutte vectorielle : PID + élimination des gîtes larvaires + distribution massive de MILDA.

Orange

*Préparation : Vérifiez les stocks de médicaments et insecticides.
*Lutte ciblée : Distribuez des MILDA et nettoyez les gîtes à moustiques.


Jaune

*Veille sanitaire : Surveillez les cas suspects et les données météo.
*Prévention légère : Éliminez les eaux stagnantes et rappelez l'usage des MILDA.



copyright (®) CAPC-AC

Prévison du 04 Juillet au 17 Août 2026



Diffusé le 22 juillet 2026
Valide: 2 semaines (04 Aout - 17 Aout 2026)

Surveillance Passive	Veille Sanitaire
Surveillance Renforcée	Surveillance Active

Recommandations 8

Rouge


* Urgence : Activez les plans d'urgence et mobilisez les équipes sanitaires.
*Lutte vectorielle : PID + élimination des gîtes larvaires + distribution massive de MILDA.

Orange

*Préparation : Vérifiez les stocks de médicaments et insecticides.
*Lutte ciblée : Distribuez des MILDA et nettoyez les gîtes à moustiques.

Jaune

*Veille sanitaire : Surveillez les cas suspects et les données météo.
*Prévention légère : Éliminez les eaux stagnantes et rappelez l'usage des MILDA.



copyright (®) CAPC-AC

Salle de Veille Multirisque

Conclusion

Les analyses climato-sanitaires de la période en cours indiquent une propension accrue à la transmission du paludisme dans plusieurs zones de la sous-région, en raison des conditions environnementales favorables à la prolifération des vecteurs.

Face à cette configuration, il est impératif de maintenir une Surveillance accrue et une coopération intersectorielle entre les acteurs de la santé publique, de la météorologie et de la gestion des risques.

Recommandations

Le Centre de Veille Recommande

- Poursuivre le monitoring entomologique dans les zones identifiées comme sensibles
- Activer les mécanismes d'alerte Précoce et la diffusion régulière d'informations vers les autorités locales et les partenaires techniques
- Renforcer les capacités communautaires en matière de prévention et de surveillance, afin d'anticiper les pics de transmission et de limiter les impacts sanitaires.