



BULLETIN CLIMATIQUE D'AIDE AUX ACTIONS ANTICIPATOIRES

Zones équatoriale et sud de la CEEAC

SON 2026 et démarrage de la saison principale 2026-2027

Initialisation C3S : 1er août 2026 | Référence régionale : PRESAC-22 | Mise à jour : 2 septembre 2026

VIGILANCE RENFORCÉE : EXCÈS D'EAU LOCALISÉS ET DÉMARRAGES À CONFIRMER

MESSAGE ESSENTIEL

Deux horizons doivent être suivis simultanément. En zone équatoriale, SON 2026 est plutôt normale à excédentaire au centre et à l'est, mais plus déficitaire sur la façade atlantique. Au Sud, la saison principale 2026-2027 s'installe progressivement du nord vers le sud ; les cumuls sont souvent normaux à excédentaires, avec des poches sèches et un démarrage plus tardif au sud et au sud-ouest. Les décisions doivent rester localisées et mises à jour très régulièrement.

Messages clés pour l'action anticipatoire

1. **Zone équatoriale - SON** : pluies normales à excédentaires au centre et à l'est ; signal déficitaire sur la façade atlantique.
2. **Zone sud - démarrage** : installation généralement de fin septembre-octobre au nord, puis novembre-décembre vers l'extrême sud ; confirmation locale indispensable.
3. **Zone sud - pluies** : signal souvent normal à excédentaire au centre et à l'est, mais poches déficitaires au nord-ouest, au sud et au sud-ouest.
4. **Séquences** : épisodes humides persistants probables sur une large partie du domaine ; risque de pause sèche plus marqué localement au sud-ouest de l'Angola.

Niveau de confiance

Produit	Éléments de confiance	Niveau
SON équatoriale	Convergence PRESAC-22/C3S sur le contraste ouest-centre-est ; détails locaux variables.	MODÉRÉ
Fin de SON	Seulement 85 mailles valides, surtout entre 0 et 5°N ; fourchette P10-P90 large.	FAIBLE À MODÉRÉ
Début au Sud	Membres valides, mais aucune catégorie ne domine partout et la calibration est peu retenue.	MODÉRÉ
Pluie/séquences Sud	Signal humide fréquent ; accord et bénéfice de calibration variables selon la maille.	MODÉRÉ

Décisions à engager sans attendre

- Échelonner les semis et réserver des semences de re-semis dans les zones de démarrage incertain ou tardif.
- Prépositionner les moyens de gestion des inondations dans le bassin central, à l'est et dans les secteurs humides du Sud.
- Renforcer le suivi de l'eau et des pâturages au sud et au sud-ouest de l'Angola.

1. Zone équatoriale : calendrier de SON 2026

Les terciles comparent chaque date prévue à la climatologie CHIRPS 1993-2025.

Début de saison des pluies
Zone équatoriale CEEAC | Saison SON 2026
Initialisation C3S : août 2026




Figure 1. Probabilités d'un démarrage précoce, normal ou tardif de SON 2026.

DÉBUT DE SAISON

Les prévisions suggèrent un démarrage tardif sur la façade atlantique, avec une probabilité faible d'après le consensus du PRESAC-22. Le consensus régional prévoit un démarrage précoce à normal au Rwanda, au Burundi et à l'est de la RDC. Déclencher les opérations agricoles après confirmation locale.




Figure 2. Fourchette P10-médiane-P90 de la fin de saison prévue.

FIN DE SAISON

La médiane varie du 16 novembre au 23 décembre ; la médiane régionale est le 3 décembre. L'intervalle P10-P90 varie de 17 à 40 jours (médiane : 26 jours).

2. Zone équatoriale : pluviométrie contrastée

Les probabilités par tercile indiquent où le cumul SON a le plus de chances d'être inférieur, proche ou supérieur à la normale 1993-2025.

Cumul pluviométrique saisonnier
Zone équatoriale CEEAC | Saison SON 2026
 Initialisation C3S : août 2026




Figure 3. Cumul SON 2026 : probabilités en dessous, normale et au-dessus de la normale.




Figure 4. Écart du cumul médian prévu à la médiane CHIRPS, en millimètres et en pourcentage.

Zones


- **Bassin central** : probabilité d'un cumul au-dessus de la normale souvent comprise entre 40 et 60 %, avec des anomalies de 0 à +15 % ; signal cohérent avec le PRESAC-22.
- **Façade atlantique** : déficit relatif marqué sur une partie de la Guinée équatoriale et du Gabon, avec localement 60 à 90 % de probabilité d'être sous la normale.
- **Est** : le PRESAC-22 prévoit des pluies excédentaires à normales à l'est de la RDC, au Rwanda et au Burundi.

Attention

Un déficit relatif ne signifie pas une saison sèche dans une région très arrosée. Pour le cumul, la calibration logistique n'améliore l'historique que sur une partie des mailles ; ailleurs, la fréquence brute est conservée.

3. Zone équatoriale : séquences et vigilance

Séquences persistantes après le début de saison
Zone équatoriale CEEAC | Saison SON 2026
Initialisation C3S : août 2026



Source : C3S multi-modèle calibré avec CHIRPS | Initialisation : 01/08/2026 | CEEAC équatoriale — seconde saison SON

Figure 5. Probabilité d'une séquence sèche d'au moins 10 jours (CDD) et humide d'au moins 5 jours (CWD). Seuil : 1 mm/jour.

SIGNAL DE PERSISTANCE

Une séquence humide d'au moins 5 jours atteint souvent 80 à 100 % de probabilité. Une séquence sèche d'au moins 10 jours reste généralement sous 20 %, mais atteint localement 40 à 60 % à l'ouest. Le PRESAC-22 signale néanmoins de longues pauses post-démarrage possibles au nord du Congo et de la RDC.

Implications immédiates

- **Protection civile** : curage, vérification des sites d'accueil et prépositionnement dans les zones urbaines et bassins sensibles.
- **Agriculture** : confirmation locale des semis, réserve de semences et drainage dans les secteurs les plus humides.
- **Eau, transport et santé** : suivre rivières et barrages, inspecter les ouvrages et renforcer la surveillance WASH et antivectorielle.

RÈGLE DE DÉCISION

Une prévision saisonnière guide la préparation mais ne déclenche pas seule une alerte. Confirmer avec les prévisions à 3-10 jours, l'humidité des sols, les niveaux d'eau et les alertes nationales.

4. Zone sud : installation de la saison principale 2026-2027

Le calendrier absolu indique quand la saison peut commencer ; les terciles indiquent si ce démarrage est précoce, normal ou tardif par rapport à la climatologie locale.




Figure 6. Fourchette P10-médiane-P90 du début de la saison principale 2026-2027.




Figure 7. Probabilités d'un démarrage précoce, normal ou tardif par rapport à CHIRPS 1993-2025.

Faits majeurs

La date médiane progresse globalement de fin septembre-mi-octobre dans la bande nord vers novembre-décembre dans l'extrême sud. Les probabilités par tercile restent morcelées : aucune catégorie ne domine uniformément. Le PRESAC-22 prévoit un démarrage tardif au sud de la RDC et au nord-est de l'Angola, tandis qu'au sud la saison serait surtout décalée. Échelonner les semis et attendre une confirmation pluviométrique et agronomique locale.

CONFIANCE SUR LE DÉMARRAGE

Confiance modérée et suivi local indispensable.

5. Zone sud : pluies, séquences et actions prioritaires

Cumul pluviométrique saisonnier
Sud CEEAC | Saison principale 2026-2027
Initialisation C3S : août 2026




Figure 8. Probabilités du cumul saisonnier : en dessous, normale et au-dessus de la normale.

Séquences persistantes après le début de saison
Sud CEEAC | Saison principale 2026-2027
Initialisation C3S : août 2026




Figure 9. Après le démarrage : probabilité d'une séquence sèche d'au moins 10 jours et humide d'au moins 5 jours.

DIAGNOSTIC SUD

Le cumul est souvent normal à excédentaire au centre et à l'est, avec des poches sèches sur certaines marges sud et sud-ouest. Une séquence humide d'au moins 5 jours est très probable (souvent 80 à 100 %). Le risque d'au moins 10 jours secs reste généralement faible, mais augmente localement au sud-ouest de l'Angola.

Matrice d'action anticipatoire

Priorité	Zone/signal à surveiller	Action anticipatoire
Semis et re-semis	Installation tardive ou incertaine ; façade atlantique, sud RDC et Angola.	Déclencher après confirmation locale ; échelonner les semis ; sécuriser semences et intrants.
Inondations	Bassin central, est équatorial et secteurs humides du Sud.	Actualiser les plans d'urgence ; curer les drains ; prépositionner secours et moyens WASH.
Eau et élevage	Sud et sud-ouest de l'Angola : démarrage plus tardif et risque sec localement accru.	Suivre points d'eau et pâturages ; préparer transport d'eau, aliments bétail et ciblage social.
Suivi rapproché	Signaux saisonniers localement divergents ou modérément confiants.	Revue hebdomadaire : pluie à 3-10 jours, humidité des sols, rivières, barrages et alertes nationales.

Sources : Communiqué final PRESAC-22, Kigali, 21 août 2026 ; C3S multi-modèle calibré avec CHIRPS v2.0 (1993-2025), CAPC-AC v8, initialisation 01/08/2026.