



BULLETIN CLIMATIQUE D'AIDE AUX ACTIONS ANTICIPATOIRES

Fin de saison 2026 dans la zone nord de la CEEAC

Tchad, Cameroun septentrional et République centrafricaine

Initialisation C3S : 1er août 2026 | Référence régionale : PRESAC-22 | Mise à jour : 3 septembre 2026

VIGILANCE AGRICOLE : FIN POTENTIELLEMENT PRÉCOCE, CONFIRMATION LOCALE REQUISE

MESSAGE ESSENTIEL

Le PRESAC-22 prévoit une fin précoce sur la bande soudanienne, du sud du Tchad au nord de la RDC en passant par le nord du Cameroun et la RCA, avec un risque de saison agricole raccourcie. C3S-CHIRPS fournit un calendrier nord-sud cohérent, mais ses catégories précoce/normale/tardive sont plus partagées entre modèles. Les dates doivent donc servir de fenêtres de préparation, à confirmer chaque semaine par les observations et les services nationaux.

Messages clés pour l'action anticipatoire

1. **Tchad** : fin attendue de fin août à mi-septembre au nord, de mi-septembre à début octobre au centre et de début à fin octobre au sud ; prudence accrue au nord où la qualité est plus faible.
2. **Cameroun** : fenêtre médiane autour de début octobre dans l'Extrême-Nord, puis de la deuxième moitié d'octobre dans les régions du Nord et de l'Adamaoua.
3. **RCA** : fin progressive de mi-octobre au nord vers fin octobre-début novembre au centre et dans la moitié sud ; ne pas appliquer une date unique à tout le pays.
4. **Nord de la RDC** : le PRESAC-22 signale une fin précoce ; suivre les produits nationaux et les mises à jour régionales.

Niveau de confiance

Produit	Éléments de confiance	Niveau
Dates calendaires	Accord à ± 7 jours souvent de 4/5 à 5/5 dans le sud du Tchad, le nord du Cameroun et la RCA.	MODÉRÉ À ÉLEVÉ
Catégorie de fin	Votes plus dispersés ; calibration logistique retenue sur seulement 6 à 13 % des mailles selon la catégorie.	FAIBLE À MODÉRÉ
Cumul saisonnier	Signal déficitaire au Tchad plus marqué que sur la bande méridionale ; accord intermodèles souvent limité à 2/5 ou 3/5.	MODÉRÉ
Extrême nord du domaine	Échecs de détection et incertitude plus élevés dans le nord du Tchad ; ne pas utiliser une date isolée.	FAIBLE


Actions Anticipatoires

- Préparer récolte, séchage et stockage au sud du Tchad, dans l'Extrême-Nord et le Nord Cameroun ainsi qu'au nord de la RCA.
- Sécuriser les points d'eau, le fourrage et les itinéraires de transhumance au Tchad et dans l'Extrême-Nord Cameroun.
- Mettre en place une revue hebdomadaire croisant pluie à 3-10 jours, humidité des sols, stades culturaux et alertes nationales.

1. Quand la saison pourrait-elle se terminer ?

La date médiane indique le centre de l'éventail des membres. Elle ne constitue ni une date certaine ni une consigne agricole uniforme.

Fin de saison des pluies
Nord CEEAC | Saison principale 2026
Initialisation C3S : août 2026



Source : C3S multi-modèle calibré avec CHIRPS | Initialisation : 01/08/2026 | Nord CEEAC — fin de la saison principale

Figure 1. Date médiane prévue de fin de la saison principale 2026.

Calendrier indicatif par pays et sous-zone

Pays et partie concernée	Plage des dates médianes	Lecture opérationnelle
Tchad - partie nord	22 août - 14 septembre	Fin très précoce dans le calendrier, mais qualité plus faible : confirmation locale indispensable.
Tchad - partie centrale	17 septembre - 12 octobre	Préparer progressivement récolte, abreuvement et transition pastorale.
Tchad - partie sud	9 - 24 octobre	Fenêtre sensible pour le remplissage des grains et les cultures semées tardivement.
Cameroun - Extrême-Nord	30 septembre - 13 octobre	Réduire l'exposition des cultures tardives et sécuriser le séchage post-récolte.
Cameroun - Nord et Adamaoua	20 - 30 octobre	Maintenir le suivi des pluies utiles avant de confirmer la fin effective.
RCA - partie nord	13 - 30 octobre	Anticiper une fin progressive et surveiller les poches de déficit hydrique.
RCA - centre et moitié sud	27 octobre - 5 novembre	Les pluies peuvent se poursuivre plus longtemps ; ne pas généraliser le signal du nord.

Attention

Les plages ci-dessus sont les minima et maxima des dates médianes de mailles regroupées par grandes sous-zones. Elles ne remplacent pas une prévision administrative locale.

2. Fin précoce, normale ou tardive ?

Chaque catégorie est définie relativement à la climatologie locale CHIRPS 1993-2025. Une date d'octobre peut donc être tardive dans une zone et précoce dans une autre.

Fin de saison des pluies
Nord CEEAC | Saison principale 2026
Initialisation C3S : août 2026




Figure 2. Probabilités des trois catégories de fin de saison.

Fin de saison des pluies
Nord CEEAC | Saison principale 2026
Initialisation C3S : août 2026




Figure 3. Catégorie présentant la probabilité la plus élevée à chaque maille.

DIVERGENCE À GÉRER.

Le PRESAC-22 retient une fin précoce sur le sud du Tchad, le nord du Cameroun, la RCA et le nord de la RDC. C3S-CHIRPS montre plutôt un signal mixte, avec plusieurs mailles tardives dans la bande méridionale. L'accord catégoriel est souvent limité et la correction logistique n'est retenue que sur 11 % des mailles pour précoce, 13 % pour normale et 6 % pour tardive. En conséquence, ne pas annoncer une catégorie unique : utiliser le calendrier absolu et les mises à jour locales comme base de décision.

3. Incertitude et robustesse des dates




Figure 4. Fourchette P10-médiane-P90 de la date de fin de saison.




Figure 5. Nombre de modèles situés à ± 7 jours de la médiane multi-modèle.




Figure 6. Diagnostics de qualité appliqués aux dates de fin de saison.

CE QUE L'INCERTITUDE CHANGE

La largeur P10-P90 est médiane de 18 jours sur les mailles exportées ; la moitié centrale se situe approximativement entre 15 et 23 jours, avec un maximum de 51 jours. L'accord sur la date est souvent de 4/5 à 5/5 dans la partie centrale et méridionale, mais la qualité se dégrade dans l'extrême nord du Tchad. Un bon accord sur une date n'implique pas automatiquement un bon accord sur la catégorie climatologique.

4. Cumul saisonnier et risque de déficit hydrique

Le cumul de toute la saison et sa date de fin répondent à deux questions différentes : un cumul normal n'exclut pas une fin précoce ni un déficit pendant le remplissage des grains.

Cumul pluviométrique saisonnier
Nord CEEAC | Saison principale 2026
Initialisation C3S : août 2026




Figure 7. Probabilités des terciles du cumul de la saison principale 2026.

Cumul pluviométrique saisonnier
Nord CEEAC | Saison principale 2026
Initialisation C3S : août 2026




Figure 8. Cumul médian prévu, médiane CHIRPS et anomalies absolue et relative.

PAR PAYS

Au Tchad, le signal déficitaire est le plus marqué du centre vers le nord, avec une prudence particulière dans les zones climatologiquement très sèches. Dans le sud du Tchad, l'Extrême-Nord Cameroun et le nord de la RCA, PRESAC-22 privilégie des pluies normales à déficitaires au sud du Tchad et dans l'Extrême-Nord Cameroun, mais normales à excédentaires au centre et à l'est du Cameroun ainsi que dans le sud et l'ouest de la RCA. Les écoulements sont néanmoins annoncés inférieurs aux normales au Cameroun, au sud du Tchad et en RCA : renforcer le suivi des retenues, cours d'eau et points d'eau.

5. Actions prioritaires par pays et sous-zone




Figure 9. Votes des modèles sur les catégories du cumul saisonnier.

CONFIANCE SUR LE CUMUL

L'accord maximal sur une catégorie est souvent de 2/5 à 3/5. La calibration logistique n'améliore l'historique que sur 21 % des mailles pour en dessous, 33 % pour normale et 16 % pour au-dessus ; ailleurs, la fréquence brute est conservée. Les actions doivent donc être réversibles, ciblées et actualisées.

Matrice d'action anticipatoire

Priorité	Pays et zones à surveiller	Action anticipatoire
Cultures et récoltes	Sud du Tchad, Extrême-Nord et Nord Cameroun, nord et centre de la RCA.	Suivre la maturité ; avancer les récoltes lorsque nécessaire ; éviter les semis tardifs de variétés à cycle long ; sécuriser séchage et stockage.
Eau et élevage	Nord et centre du Tchad, Extrême-Nord Cameroun et nord de la RCA.	Suivre points d'eau et pâturages ; préparer stocks fourragers, itinéraires de transhumance et appui aux éleveurs vulnérables.
Hydrologie et feux	Cameroun septentrional, sud du Tchad et RCA ; vigilance prolongée en Adamaoua et au sud de la RCA.	Surveiller les bassins et retenues ; entretenir pare-feu ; éviter les brûlis précoces ; maintenir l'alerte aux pluies intenses résiduelles.
Suivi coordonné	Tchad, Cameroun, RCA et, selon le PRESAC-22, nord de la RDC.	Actualiser chaque semaine avec prévisions à 3-10 jours, humidité des sols, stades culturaux et bulletins des services nationaux.

RÈGLE DE DÉCISION

Confirmer toute action majeure en croisant cinq éléments : la fenêtre P10-P90, l'accord des modèles, la pluie observée, l'humidité des sols et le stade des cultures. Une cellule blanche signifie résultat indisponible ou non valide, jamais absence de risque.

Sources : Communiqué final PRESAC-22, Kigali, 21 août 2026 ; C3S multi-modèle calibré avec CHIRPS v2.0 (1993-2025), CAPC-AC v8, initialisation 01/08/2026