



Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale



Note Technique de Prévision Intra-saisonnière ECCAS

Initialisée le : 30 Septembre 2025

Valide : du 01er au 30 Octobre 2025

Contact : contact@capc-ac.net

Noms	Fonction	Contacts
FENDOM NINYIM Valère	Stagiaire, Master 2 (Géographie), Université de Douala	+237 655448563 valereterullien02@gmail.com
FOKAM NGONGANG Ludric	Stagiaire, Etudiant Master 2 (physique) Université de Douala	+237 691247616 armandludricngongang@gmail.com
KENGNE Rodrigue Singor	Stagiaire, Élève Ingénieur (Niveau 5, Météorologie), Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala	+237 651317199 rodrig.s0614@gmail.com
MINKO NNA VADYS Joel	Stagiaire, Élève Ingénieur (Niveau 5, Météorologie), Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala	+237 656097167 joelsteevelin@gmail.com
MOUNABBAHOU Mal OUMAROU	Stagiaire, Élève Ingénieur (Niveau 5, Météorologie), Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Douala	+237 690302645 mmounabbahou@gmail.com
Dr-Ing IGRI MOUDI Pascal	Consultant UNDRR Expert Régional en Prévision Numérique du Temps	+237 655868308 moudipascal@yahoo.fr

La période analysée présente un contraste marqué entre des conditions sèches et humides, variant selon les régions et les décades.

La première décade (1er-10 août) sera caractérisée par des séquences sèches persistantes dans le Sud-Est de la RDC, le Congo, le Centre du Gabon, le Sud du Cameroun et le Centre du Tchad, tandis que des conditions humides avec jusqu'à huit jours consécutifs de pluies sont attendues dans le Nord-Est de la RDC, le Centre et le Sud-Est du Tchad, ainsi que le Nord et la Côte camerounaise.

La deuxième décade (11-20 août) devrait être globalement plus humide, avec des implications importantes pour l'agriculture, la santé et les ressources en eau.

Les perspectives pour les zones sèches, notamment le Centre et le Nord du Tchad, indiquent un risque accru de stress hydrique pour les cultures, une augmentation des maladies vectorielles comme le paludisme, et un assèchement des cours d'eau nécessitant une gestion proactive des ressources. À l'inverse, les régions humides, telles que le Nord-Est de la RDC, le Centre et l'Est de la RCA, et le Nord Cameroun, bénéficieront d'une amélioration des rendements agricoles et d'une recharge des nappes phréatiques, bien que le risque d'inondations doivent être surveillé.


La troisième décade (21-31 septembre) accentuera ces contrastes, avec des séquences sèches modérées prévues dans le Sud-Est de la RDC, le Rwanda, le Nord de l'Angola et le Centre du Tchad, pouvant engendrer des pertes agricoles. Simultanément, des précipitations intenses et prolongées sont attendues dans le Sud du Tchad, en RCA, au Nord-Ouest et au Sud de la RDC, et sur la Côte camerounaise, avec des cumuls dépassant parfois 25 mm sur deux jours. Ces conditions favoriseront la recharge des nappes mais augmenteront les risques d'inondations, de maladies végétales et de dommages aux infrastructures.

Prévisions intra-saisonnières à partir des Indices Climatiques

Indices Pluviométriques : du 01^{er} au 10 octobre 2025

Indice des Jours Consécutifs Secs (<1 mm)


Maximum de jours secs consécutifs (précip < 1mm)
 Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
 Moyenne Multi-Modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette situation pourrait entraîner un assèchement profond et fissuration, réduisant la disponibilité en eau et en nutriments pour les plantes.

**Maximum de jours humides consécutifs (précip ≥ 1 mm)
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles**




Des précipitations d'environ dix jours consécutifs sont prévues dans la bande 10°S à 12°N.

Cette pluviométrie va considérablement contribuer à la recharge des nappes phréatiques, les cours d'eau, les lacs et les barrages (Sud du Tchad, en RCA).

Elle assurera une humidité du sol optimale pour des cultures vivrières (maïs, mil, sorgho, manioc) et de rente (cacao, café, huile de palme dans certaines zones).

Indice des Jours Consécutifs Humides (>25 mm)

Maximum de jours très humides consécutifs (précip ≥ 25 mm)
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles




Des précipitations intenses d'environ deux jours consécutifs sont prévues dans la partie Centre-Sud de la RCA, à Sud-Ouest du Cameroun, et au Centre de la RDC.


Ces pluies peuvent causer : Érosion hydrique, recharge des réserves en eau , inondations et crues éclair.

Indice des Jours Humides (RR01, RR10, RR20, RR50)


Jours avec précipitation $\geq 1\text{mm}$
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles




Jours avec précipitation $\geq 10\text{mm}$
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles



Jours avec précipitation $\geq 25\text{mm}$
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles



Jours avec précipitation $\geq 50\text{mm}$
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles



L'Est de la RDC et la Dorsale Camerounaise connaîtront une période humide significative, avec environ huit jours de précipitations, caractérisées par des intensités supérieures à 10 mm/jour.


Un temps relativement sec est prévu pour le Centre et le Nord de la RDC, ainsi que le Sud et l'Ouest de la RCA, où cinq jours de pluie sont attendus.

Conditions excellentes pour la croissance des cultures vivrières, le repiquage et le développement des cultures de rapport.


Recharge robuste des nappes phréatiques et des cours d'eau.

Précipitations extrêmes (R90p et R99p)

Jours avec précipitation > 90ème percentile
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles



Jours avec précipitation > 99ème percentile
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles



Environ 06 jours des pluies dépassant les 90e percentile sont attendues au Centre de la RDC, au Nord du Congo et au Centre et à l'Ouest de la RCA.

La décade du 01^{er} au 10 octobre sera marqué par des conditions plus ou moins humides.

Agriculture

- Risque accru de **stress hydrique** des cultures en floraison ou en phase de remplissage des grains ;
- **Retard de germination** ou **flétrissement** des jeunes plants ;
- **Durcissement et fissuration des sols**, rendant le travail du sol difficile ;
- Nécessité de **stratégies d'irrigation d'appoint** et de **paillage** pour limiter les pertes d'humidité.

Hydrologie

- **Baisse du niveau des nappes** et des points d'eau superficiels ;
- **Réduction des débits** dans les petits cours d'eau ;
- Risque accru de **déficit hydrique** dans les zones à faible réserve souterraine ;

Santé

- Augmentation possible des **cas de maladies respiratoires** liées à la poussière (asthme, bronchites) ;
- Risque de **prolifération de maladies hydriques** (choléra) si les points d'eau sont contaminés ou réduits.


Infrastructures

- Conditions favorables à l'entretien des routes rurales (moins de boue).
- Mais **risque de fissuration** des ouvrages en terre (digues, barrages agricoles).

Indices Pluviométriques : du 11 au 20 octobre 2025

Indice des Jours Consécutifs Secs (<1 mm)

Maximum de jours secs consécutifs (précip < 1mm)
Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
Moyenne Multi-Modèles




Un épisode d'au moins **huit (8) jours consécutifs secs** est prévu au **Nord du Tchad** et au **Sud-Ouest de l'Angola**.

Par ailleurs, une période d'environ **quatre (4) jours consécutifs sans précipitation** est attendue au **Centre-Sud du Tchad**, à l'**Extrême-Nord du Cameroun**, ainsi qu'au **Sud-Est** et à l'**Ouest de la RDC** et dans l'**Est** et le **Nord-Ouest de l'Angola**.

Ces conditions sèches prolongées pourraient entraîner : Un **assèchement rapide des horizons superficiels du sol**, augmentation du stress hydrique, La **fissuration des sols argileux**, Un **ralentissement de la croissance végétative** et une **baisse potentielle des rendements**, une **diminution du débit des cours d'eau mineurs** et un **affaiblissement des points d'eau de surface**

Indice des Jours Consécutifs Humides (>1 mm)

Maximum de jours humides consécutifs (précip $\geq 1\text{mm}$)
 Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
 Moyenne Multi-Modèles




Des précipitations d'environ dix jours consécutifs sont prévues dans la bande 12°S à 10°N.

Cette pluviométrie prolongée va considérablement recharger les nappes phréatiques, les cours d'eau, les lacs et les barrages (au Cameroun, en RCA, au Nord de la RDC et au Nord du Congo).

Une démarrage effectives de la saison de pluie au Centre de l'Angola, au Sud de la RDC, du Congo et du Gabon.

Indice des Jours Consécutifs Humides (>20 mm)


Maximum de jours très humides consécutifs (précip $\geq 25\text{mm}$)
 Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
 Moyenne Multi-Modèles




Des **précipitations intenses**, d'une durée d'au moins **un (1) jour**, sont prévues sur la **partie Sud de la RCA**, à l'**Ouest du Cameroun** et au **Nord de la RDC**.

Ces pluies soutenues pourraient entraîner une **recharge rapide des réserves en eau de surface et souterraines**, mais également provoquer des **crues éclair**, des **inondations localisées** et des **phénomènes d'érosion hydrique** susceptibles d'affecter les sols cultivés et les infrastructures rurale.


Anomalie - Jours avec précipitation $\geq 1\text{mm}$
Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
Moyenne Multi-Modèles




Jours avec précipitation $\geq 10\text{mm}$
Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
Moyenne Multi-Modèles



Jours avec précipitation $\geq 25\text{mm}$
Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
Moyenne Multi-Modèles



Jours avec précipitation $\geq 50\text{mm}$
Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
Moyenne Multi-Modèles



L'Est, le Centre et le Nord de la RDC, l'Est, le Centre et la Dorsale Camerounaise, le Nord du Congo connaîtront une période humide significative, avec environ huit jours de précipitations, caractérisées par des intensités supérieures à 10 mm/jour.


Un temps relativement sec est prévu pour le Sud de la RDC, ainsi que le Centre de la RCA, où environ quatre jours de pluie sont attendus.

Conditions excellentes pour la croissance des cultures vivrières, le repiquage et le développement des cultures de rapport.


Recharge robuste des nappes phréatiques et des cours d'eau.

Précipitations extrêmes (R90p et R99p)

Jours avec précipitation > 90ème percentile
Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
Moyenne Multi-Modèles



Jours avec précipitation > 99ème percentile
Décade 2025-10-11 à 2025-10-20
Moyenne Multi-Modèles



Environ 08 jours des pluies dépassant les 90e percentile sont attendues au à l'Ouest du Cameroun.

Par contre, le Centre du Cameroun, le Sud-Ouest de la RCA et à l'Est de la RDC connaîtrons au mois quatr jour des pluies intenses.

Perspectives sectorielles

Agriculture

- Les conditions sèches au Nord du Tchad et en Angola risquent d'**affecter la disponibilité en eau pour les cultures** et de **ralentir la croissance** des jeunes plants.
- Les zones recevant des pluies continues bénéficieront d'une **bonne humidité du sol**, favorable à la **germination, au repiquage et à la floraison**.
- Dans les zones de fortes pluies, des **risques d'érosion, de verse des cultures** et de **lessivage des nutriments** sont à craindre.

Hydrologie

- Les pluies prolongées contribueront à une **recharge notable des nappes et plans d'eau**, mais les pluies intenses pourraient provoquer des **crues soudaines et inondations localisées**.
- Les périodes sèches engendreront une **diminution temporaire du débit des petits cours d'eau** et des **tensions sur les ressources en eau**.

Santé

- Les épisodes pluvieux intenses pourraient favoriser la **prolifération de maladies hydriques et vectorielles** (paludisme, choléra).
- En revanche, les périodes sèches prolongées augmenteront les risques de **maladies respiratoires** liées à la poussière et à la chaleur.


Infrastructures

- Les **routes rurales non revêtues** pourraient devenir difficilement praticables dans les zones à fortes pluies.
- Risque d'**érosion et de dégradation des ouvrages hydrauliques** (digues, barrages, canaux).
- Les zones sèches bénéficieront de conditions favorables pour les travaux agricoles et routiers, mais les **sols fissurés** pourraient compromettre la stabilité de certaines infrastructures locales.

Indices Pluviométriques : du 21 au 31 octobre 2025

Indice des Jours Consécutifs Secs (<1 mm)


Maximum de jours secs consécutifs (précip < 1mm)
 Décade 2025-10-21 à 2025-10-31
 Moyenne Multi-Modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.

**Maximum de jours humides consécutifs (précip $\geq$ 1mm)
Décade 2025-10-21 à 2025-10-31
Moyenne Multi-Modèles**




Des précipitations d'environ dix jours consécutifs sont prévues dans la bande 10°S à 12°N.

Cette pluviométrie prolongée va considérablement recharger les nappes phréatiques, les cours d'eau, les lacs et les barrages. Elle assurera une humidité du sol optimale pour des cultures vivrières (maïs, mil, sorgho, manioc) et de rente (cacao, café, huile de palme dans certaines zones).

Indice des Jours Consécutifs Humides (>20 mm)


Maximum de jours très humides consécutifs (précip $\geq 25\text{mm}$)
Décade 2025-10-21 à 2025-10-31
Moyenne Multi-Modèles




Des précipitations d'environ dix jours consécutifs sont prévues dans la bande 10°S à 12°N.

Cette pluviométrie prolongée va considérablement recharger les nappes phréatiques, les cours d'eau, les lacs et les barrages. Elle assurera une humidité du sol optimale pour des cultures vivrières (maïs, mil, sorgho, manioc) et de rente (cacao, café, huile de palme dans certaines zones).


Jours avec précipitation $\geq 1\text{mm}$
Décade 2025-10-21 à 2025-10-31
Moyenne Multi-Modèles




Jours avec précipitation $\geq 10\text{mm}$
Décade 2025-10-01 à 2025-10-10
Moyenne Multi-Modèles



Jours avec précipitation $\geq 25\text{mm}$
Décade 2025-10-21 à 2025-10-31
Moyenne Multi-Modèles




Jours avec précipitation $\geq 50\text{mm}$
Décade 2025-10-21 à 2025-10-31
Moyenne Multi-Modèles




Les précipitations dont l'intensité variant entre 01 mm/j à 20 mm/j sont concentrées sur la bande 05°S et 15°N pour la deuxième décade du mois d'août, offrant des conditions très humides au Nord-Est de la RDC, au Centre et à l'Est de la RCA et au Nord Cameroun.

Précipitations extrêmes (R90p et R99p)

Jours avec précipitation > 90ème percentile
Décade 2025-10-21 à 2025-10-31
Moyenne Multi-Modèles






Jours avec précipitation > 99ème percentile
Décade 2025-10-21 à 2025-10-31
Moyenne Multi-Modèles



Environ 06 jours des pluies dépassant les 90e percentile sont attendues au Centre de la RDC, au Nord du Congo et au Centre et à l'Ouest de la RCA.







Indices Hydrologiques

Anomalie d'écoulement de surface (multi-modèle) - 1-10_Octobre Anomalie d'écoulement total (multi-modèle) - 11-20_Octobr Anomalie d'écoulement de surface (multi-modèle) - 21-31_Octobre




Des ruissellements moyen à fort sont prévus durant la deuxième et troisième décade du mois d'août au Tchad, en RCA (au Nord), au Nord de la RDC et à l'Extrême-Nord Cameroun. Situation favorable pour engendrer l'érosion.

Anomalie d'écoulement souterrain (multi-modèle) - 1-10_Octobre Anomalie d'écoulement souterrain (multi-modèle) - 11-20_Octobre Anomalie d'écoulement souterrain (multi-modèle) - 21-31_Octobre




Ecoulement souterrain marqué au Centre-Est et au Nord du Tchad, à l'Extrême-Nord favorisant la recharge de la nappe phréatique et alimentation des réservoir d'eau.


Anomalie d'écoulement total (multi-modèle) - 1-10_Octobre



Anomalie d'écoulement total (multi-modèle) - 11-20_Octobre




Anomalie d'écoulement total (multi-modèle) - 21-31_Octobre



Écoulement souterrain marqué au Centre-Est du Tchad et à l'Extrême-Nord Cameroun favorisant la recharge de la nappe phréatique et alimentation des réservoirs d'eau.

Anomalie d'humidité du sol : Moyenne des niveaux

Anomalie d'humidité du sol (moyenne des niveaux)
01-10 Octobre




Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.

Anomalie d'humidité du sol : Moyenne des niveaux

Anomalie d'humidité du sol (moyenne des niveaux)
11-20 Octobre




Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.

Anomalie d'humidité du sol : Moyenne des niveaux

Anomalie d'humidité du sol (moyenne des niveaux)
21-30 Octobre



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.


Anomalies thermiques

La décade du 01 au 10 août sera marqué par des conditions suivantes :

- **Séquences Sèches** : Des séquences sèches sont prévues au Sud-Est de la RDC, au Congo, au Centre du Gabon, le Sud du Cameroun et le Centre du Tchad.
- **Conditions Humides** : Le au Nord-Est de la RDC, au Centre et au Sud-Est du Tchad, au Nord et sur la Côte Camerounaise auront une fréquence de 08 jours consécutifs de pluies. Par contre, le Nord du Congo, le Sud-Ouest de la RDC, l'Ouest de la RCA et le Sud et l'Ouest du Cameroun connaîtront au plus cinq jours consécutifs des pluies supérieurs à 1 mm.

Anomalie de température du sol

Anomalie de température du sol : Du 1-10 Octobre
Moyenne multi-modèles




Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.

Anomalie de température du sol

Anomalie de température du sol : Du 11-20 Octobre
Moyenne multi-modèles




Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.

Anomalie de température du sol


Anomalie de température du sol : Du 21-30 Octobre
Moyenne multi-modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.


Anomalie de Température Maximale : Du 1-10 Octobre
Moyenne multi-modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.


Anomalie de Température Maximale : Du 11-20 Octobre
Moyenne multi-modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.


Anomalie de Température Maximale : Du 21-30 Octobre
Moyenne multi-modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.


Anomalie de la Tmin : Du 1-10 Octobre
Moyenne multi-modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.


Anomalie de la Tmin : Du 11-20 Octobre
Moyenne multi-modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.

Anomalie de la Tmin : Du 21-30 Octobre
Moyenne multi-modèles



Un épisode d'au moins 10 jours consécutifs secs est prévu au Nord du Tchad, au Sud-Ouest de l'Angola et du au Sud-Est de la RDC. Par ailleurs, environ 4 jours consécutifs seront observer au centre du Tchad et de l'Angola.

Cette période prolongée assèche les sols et stresse les cultures et les pâturages (Tchad) ; disproportionné et réduire les rendements.

Conditions Météorologiques

- **Sécheresse** : Centre et Nord du Tchad, Sud-Cameroun, Ouest de la RCA, Nord-Ouest de la RDC, ce qui peut entraîner le stress hydrique, assèchement des cours d'eau, risques pour les cultures et l'élevage.
- **Humidité et fortes pluies** : Nord-Est de la RDC, RCA, Sud du Tchad, côte et Extrême-Nord Cameroun. Risques d'inondations (Sud-Est du Tchad, Nord de la RCA), recharge des nappes phréatiques, mais aussi érosion des sols (Est du Tchad, Nord de la RCA).

Infrastructures

- **Risques d'inondations** : Dommages aux routes, ponts et habitations (notamment au Sud-Est du Tchad, Nord de la RCA, côte camerounaise).
- **Zones sèches** : Pression sur les infrastructures hydrauliques (puits, barrages) en raison de la baisse des ressources en eau.

Santé Publique

- **Zones sèches** : Stress hydrique pouvant aggraver les problèmes d'accès à l'eau potable.
- **Zones humides** : Augmentation des maladies liées à l'humidité (infections respiratoires, diarrhéiques) ; risque de propagation des vecteurs dans les zones inondées.

Agriculture

- **Zones sèches** : Baisse des rendements possible sans mesures d'adaptation.
- **Zones humides** : Conditions favorables pour les cultures au Sud du Tchad et à l'Extrême-Nord Cameroun ; et risque de pertes localisées dues aux inondations (dégâts sur les champs).
- **Précipitations intenses** : Menace pour les cultures sensibles à l'excès d'eau (pourriture, lessivage des sols).